

CLAVE PARA LAS ESPECIES COLOMBIANAS DE *ACALYPHA*

Clave de los subgéneros

1. Flores femeninas pediceladas, cáliz de 4 ó 5 sépalos; brácteas inconspicuas, no acrescentes en el fruto subgén. *Linostachys*
 1'. Flores femeninas sésiles, cáliz de 3 sépalos; brácteas grandes, foliáceas, acrescentes en el fruto subgén. *Acalypha*

Subgénero *Linostachys*

1. Lámina foliar palmatinervia 2
 1'. Lámina foliar pinnatinervia 4
 2. Planta con diminutas glándulas esféricas de aspecto resinoso, principalmente en el envés foliar; ovario glabro *A. villosa*
 2'. Planta sin glándulas de aspecto resinoso; ovario generalmente pubescente 3
 3. Ovario con pelos de c. 1 mm de largo que cubren parcialmente los estilos; estilos unidos sólo en la base *A. chocoana*
 3'. Ovario glabro o con pelos de c. 0.5 mm de largo; estilos unidos en 1/4 de su longitud *A. colombiana*
 4. Hojas subsésiles o con pecíolos de hasta 5 mm de largo 5
 4'. Hojas generalmente con pecíolos de más de 10 mm de largo 6
 5. Lámina foliar muy asimétrica, sin pelos glandulíferos *A. inaequilatera*
 5'. Lámina foliar generalmente simétrica, con pelos glandulíferos, la mayoría en el margen *A. mutisii*
 6. Lámina foliar glabra o subglabra; flores femeninas en racimos *A. castroviejoii*
 6'. Lámina foliar adpreso-pubescente, principalmente por el envés; flores femeninas en panículas *A. platyphylla*

Subgénero *Acalypha*

1. Hierbas o sufrútices 2
 1'. Arbustos o árboles 10
 2. Inflorescencias unisexuales, las femeninas densifloras, elipsoides o cilíndricas, que no dejan ver el eje 3
 2'. Inflorescencias unisexuales o andróginas, las femeninas laxifloras, con el eje bien visible 5
 3. Brácteas femeninas con dientes triangulares, sin aristas *A. infesta*

- 3'. Brácteas femeninas con dientes terminados en largas aristas 4
4. Ramas jóvenes y hojas sin pelos glandulíferos; lámina foliar con ápice agudo; estilos ramificados *A. arvensis*
- 4'. Ramas jóvenes y hojas con pelos glandulíferos; lámina foliar con ápice acuminado; estilos no ramificados..... *A. alopecuroides*
5. Inflorescencias femeninas terminales; brácteas hendidas en más de 1/2 de su longitud, con dientes filiformes..... 6
- 5'. Inflorescencias femeninas axilares; brácteas hendidas en c. 1/4 de su longitud, con dientes triangulares 8
6. Dientes de las brácteas hispíduos y eglandulares; ovario y cápsula papilosos y glabros o glabrados..... *A. carrascoana*
- 6'. Dientes de las brácteas glabros o con pelos glandulíferos; ovario y cápsula hispíduos o hispíduos 7
7. Brácteas con pelos glandulíferos; estípulas de c. 5 mm de largo, con pelos de hasta 1.5 mm de largo *A. schultesii*
- 7'. Brácteas sin pelos glandulíferos; estípulas de hasta 1,5 mm de largo, glabras
..... *A. setosa*
8. Plantas con inflorescencias unisexuales y andróginas..... *A. glandulosa*
- 8'. Plantas solo con inflorescencias andróginas, raramente con inflorescencias solo masculinas 9
9. Planta con denso indumento glandular en ramas jóvenes, hojas e inflorescencias ..
..... *A. plicata*
- 9'. Planta con denso indumento glandular sólo en las inflorescencias ... *A. cuspidata*
10. Inflorescencias femeninas o andróginas terminales..... 11
- 10'. Inflorescencias femeninas o andróginas axilares 13
11. Brácteas con pelos glandulíferos 12
- 11'. Brácteas sin pelos glandulíferos *A. stachyura*
12. Lámina foliar por lo general anchamente ovado-lanceolada; brácteas en el fruto con pelos glandulíferos de 0,3-0,5 mm de largo; estilos de 4-5 mm de largo
..... *A. schiedeana*
- 12'. Lámina foliar por lo general estrechamente ovado-lanceolada; brácteas en el fruto con pelos glandulíferos de c. 1 mm de largo; estilos de 7-8 mm de largo
..... *A. padifolia*
13. Inflorescencias andróginas 14
- 13'. Inflorescencias unisexuales 16
14. Lámina foliar generalmente triangular-lanceolada, palmatinervia 15

- 14'. Lámina foliar elíptico-lanceolada u oblongo-lanceolada, pinnatinervia
.....
..... *A. diversifolia*
15. Planta con denso indumento glandular en ramas jóvenes, hojas e inflorescencias.
..... *A. plicata*
- 15'. Planta con denso indumento glandular sólo en las inflorescencias.. *A. cuspidata*
16. Lámina foliar pinnatinervia 17
- 16'. Lámina foliar palmatinervia 19
17. Inflorescencias femeninas densifloras, que no dejan ver el eje *A. hispida*
- 17'. Inflorescencias femeninas laxifloras, con el eje bien visible 18
18. Lámina foliar generalmente obovada y subcuneada; inflorescencias femeninas de 7-15 cm de largo *A. cuneata*
- 18'. Lámina foliar de ovado a oblongo-lanceoladas, base de redondeada a subcordada; inflorescencias femeninas de 25-40 cm de largo *A. scandens*
19. Lámina foliar generalmente variegada; inflorescencias femeninas de hasta 10 cm de largo *A. amentacea* subsp. *wilkesiana*
- 19'. Lámina foliar no variegada; inflorescencias femeninas de más de 15 cm de largo
..... *A. macrostachya*