

Fem: ♀ multo major; pedicellus basi 2-stipulatus *solitarius* v. O! - Calyx 3-partitus persistens setoso-pilosus; pedicellus floriferus brevis, fructiferus elongatus tenuis. Stylus *brevissime* persistens; stigmata 3 simplicia.

Capsula valde 3-cocca, (e carpellis 3 globosis connatis densissime lutescente setosa; stipulis anguste triangularibus, glabris cordatis persistentibus.

Volubilis tenuis elongata, urenti-pubescens, foliis remotis alternis breviter petiolatis *ovatis* v. *oblongo-ovatis*, basi *rotundatis*, acutis serratis, parvissime adpresse urenti-pilosis, subtus fere glabris; nervis tenuibus radiatis baseos 5-in dentes excurrentibus; reticulatio creberrima, 3-gradata, 3<sup>ta</sup> obsoleta recondita.

Paraguay, Paso de Patria in Silva.

## VI. — DALECHAMPIA TERNATA, Pdi.

(*Descriptio incompleta e sicco.*)

Rami, pedunculi axillares mediocres solitarii supra basin *bracteis 2-minimis stipularibus*, approximatis gemmam spuriam foveantibus muniti, folio ideo deficiente. Gemma ad latus pedunculi, in axillis floriferis raro et parum explicata. Involucrum compressum 6-phyllum, foliolis 4 brevibus linearibus pilosis, 2 oppositis magnis planis, 2 1/2 lin; (ideo multo minoribus quam in altera specie,) luteis, (an albo-viridibus?) rotundatis glabris apice bifidis reticulatis, nervis 5 radiatis.

Herbacea volubilis tenuis, caule petiolis et pedunculis brevissime pubescentibus, foliis petiolatis *ternatis* foliolis sessilibus, integris glabris obtusis, late mucronatis, *punctis* creberrimis parum pellucidis, munita, terminali lanceolato, lateralibus sub-ovatis maxime inaequilateris; stipellis 2 subulatis, in apice petioli. Reticulatio magna non pellucida, stipulis minutis lineari-triangularibus persistentibus.

*Corrientes lecta.*

## VII. — ACALYPHA PUNCTATA, Pdi.

(non *A. peduncularis* var. *punctata* D. C. N° 146.)

Inflorescentia quoad ordinem singularis. Spicae ♂ subsessiles densissime floriferae angusto-cylindricae latero-axillares; inflorescentia generalis *adscendens*! et ramo serotino laterali in apice pre-

coce. Spica ♀ elongata *terminalis*, densiflora subsessilis precox, basi articulata, sicca decidua.

Rami apicales axillares conferti primum explicati at serotini florentes.

Mas. Pedicelli elongati tenuissimi confertissimi forte ad bracteam glomerati apice articulati at decidui. Calyx minutissimus albidus semiglobosus pilosus 4-partitus. Stamina?

Fem: flores sessiles, rachis pubescens. Bracteae magnae rotundatae, ∞ partitae, capsula *multo longiores*, laciniis linearibus, basi parce pilosae. Calyx 3-partitus.

Stigmata 3 elongata rufa glabra multifido-capillaria (at quomodo?) basi *glanduloso punctata*.

Capsula normalis pilosa minuta globosa, profunde 3-sulcata, carpello uno supero!

Suffruticosa usque 2-ulnaris caule tereti praesertim superne a petiolis porrecte *villosis*; foliis alternis breviter petiolatis ovatis opacis basi rotundatis acutis crebre minute serratis, supra parce subtus in nervis dense pubescentibus, crebre minute *pellucido punctatis*, subtus punctis *glandulosis* pellucidis parce adpersis, reticulatio creberrima viridi-pellucida, connectent. transversis, lateralibus valde obliquis, intra margine anastom. 5. v. 7 basalibus radiatis, sequent. *remotis*; stipulis elongatis subulatis marcescentibus.

*Paraguay, in fruticetis et cultis prope Asuncion.*

#### VIII. — SAPIUM BALANSAE, Pdi.

Nom. vern: *Nuati-arroyo, Guaraní*. Sign: *Spina amnis*.

Spica sola terminali androgyna, alia spicis 2 totis et constantes ♂<sup>is</sup>, una precociore terminali, alia axillaris.

Spica androgyna basi 1-3♀-fera, erecta, *stricta*, ∞ -flora. Rachis crassiuscula *flexuosa* sed *tortuosa* non articulo decidua sed marcescentia rupta, prominentiis magnis crassis subtus in carinam compressam continuatis pro flores ♂; flores sessiles ♂ symmetrice ternae, dein 2 et 1 sessiles magis distantes, intermedio precociore, infero interdum ♀.

Bracteae minutae late mucronatae; lamina maxima non marcescens, rotundata sub-convexa opaca lutea tota adnata, at margine libera e glandulis minimis connatis plurimis, poro succum extillantibus composita, ad utrumque latus bractearum, ♂<sup>1</sup> magis distantes, non e stipulis, quae in foliis desunt? transformata.