

34. **A. rubroserrata** Pax et K. Hoffm. — Frutex 2 m altus. Ramuli superne tomentosi, inferne tomentelli. Petiolus 2 cm longus, tomentosus; limbus $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ cm longus, 1—3 cm latus, ovatus, acuminatus, basi obtusus, serratus, serraturis juvenilibus ainoene purpurascens, firmus, palmatinervius, utraque facie molliter villoso-tomentosus, deinde hirtus. Flores monoici. Spicae bisexuales vel ♀, terminales et axillares, bisexuales terminales $2\frac{1}{2}$ cm longae, maxima parte ♂, basi bracteas ♀ paucas gerentes, bisexuales axillares abbreviatae, inferne ♀, superne ♂, spicae ♀ terminales circ. 4, ♀ axillares ad 2 cm longae, interdum seta sterili terminatae; bracteae ♀ fructigerae circ. 3 mm longae, in spicis androgynis minores, 5 mm latae, rotundato-obtusae, tomentosae et dense stipitato-glandulosae, 7—11-denticulatae, dentibus triangularibus, acutis. Sepala ♀ ovata, acuta, longe ciliata et glandulosa; ovarium villosum; styli 2—3 mm longi, superne ± 5—8-lacinulati. Capsula verrucosa. Semina vix 1 mm longa, minutissime puncticulata.

Provinz des tropischen Zentralamerika: Mexiko, Puebla (Arsène n. 2420!), Tlaxcala, 2290 m (Arsène n. 1741!); Maltrata (Kerber n. 270!); Cerro de Guadalupe bei Mexiko (Bourgeau 269!).