

450 m, leg. Steinbach (1200 IV 1915; (LIL., BA.) Prov. Sara, Dep. Santa Cruz, Río Palometillas, alt. 400 m, leg. Steinbach (6761) 17 XII 1924.

Acalypha Schreiteri Lillo ex Lourteig et O'Donell nov. sp. ¹.

Frutex aut arbor (2-5 m); *rami juveniles adpresse pubescentes, glabrescentes. Internodia* (2-5 cm). *Petioli* (0,5-3,5 cm) *pubescentes. Folia ovato-lanceolata usque ovata* (5-12 × 2-6 cm), 6-8-pinnatinervia, *acuminata aut cuspidata, facie superiore glabrescente, facie inferiore pilis hirsutis supra nervis instructa, margine delicate usque crasse serrata, basi rotundata interdum angustata, 5-nervia. Stipulae lineares* (5-8 mm) *pubescentes. Spicae axillares androgynæ* (3-16 cm) *unica bractea ♀ instructae, reliquum spicae floribus ♂ congestis. Bractea ♂ ovata* (3-12 mm) *1-flora, paucis pilis hirsutis in duabus faciebus munita, 7-palmatipartita, lacinia media maiore.*

Flos ♀: Sepala 3, ovata, pubescentia; ovarium muricatum, hirsuto-pubescentis. Styli crassi pluri-aut multipinnatilacinati, paucis pilis in dorso instructi. Capsula pubescens, vix muricata (\pm 3mm). *Semina minute punctata. Affinis est « A. diversifolia » Jacq.*

Typus: Argentina: (3579 LIL.) Tucumán, Dep. Tafi, Quebrada de los Saucos, alt. 1800 m, leg. Schreiter (1388) 27 XI 1920.

Arbusto o árbol (2-5 m), ramas jóvenes adpreso-pubescentes, glabrescentes. Internodios (2-5 cm). Peciolos (0,5-3,5 cm) pubescentes. Hojas ovado-lanceoladas a ovadas (5-12 × 2-6 cm), 6-8 penninervadas, acuminadas o cuspidadas, cara superior glabrescente, cara inferior con pelos hirsutos sobre las nervaduras, borde fina a groseramente serrado, base redondeada, a veces enangostada, 5-nervada. Estípulas lineares (5-8 mm) pubescentes. Espigas axilares androginas (3-16 cm) con 1 bráctea ♀ en la base, el resto de flores ♂ apretadas. Bráctea ♀ ovada (3-12 mm) 1-flora, con algunos pelos hirsutos en ambas caras, 7 palmatipartida, lacinia media mayor.

¹ Dedicada al naturalista Carlos Rodolfo Schreiter.

Flor ♀: Sépalos 3, ovados, pubescentes; ovario muricado, hirsuto-pubescente. Estilos gruesos pluri- o multipinatilacinia-




Fig. 18. — *Acalypha Schreiteri*: A, rama $\times 1$; B, fl. ♀ $\times 3$; C, bráctea ♀ $\times 2$; D, bráctea ♀ $\times 6$. (Schreiter 1388). Dibujo: D. Villalón

dos, con algunos pelos en el dorso. Cápsula pubescente apenas muricada (± 3 mm). Semilla finamente foveolada.

Tipo: Argentina: (3579 LIL.) Tucumán, Dep. Tafí: Quebrada de los Saucos, alt. 1800 m, leg. Schreiter (1388) 27 XI 1920.

Distribución geográfica en Argentina. — Jujuy, Tucumán.

Material estudiado. — Jujuy: (11557 SI.) Valle Grande, leg. Burkart y Troncoso 28 II 1940.

Tucumán: (LIL.) Dep. Tafi, Quebrada de los Saucos, alt. 1800 m, leg. Schreiter (1388) 26 XI 1920; (LIL.) Duraznos Blancos, alt. 1800 m, leg. Lillo (8626) 27 XI 1908; (3580 LIL.) Quebrada de San Miguel, alt. 1500 m, leg. Schreiter 24 XI 1921; (LIL.) El Clavillo, leg. Jørgensen (1807) 20 XII 1916.