

54. *A. brevipes* Müll. Arg. in Fl. Bras. XI. 2. (1874) 348. — *A. communis* var. *brevipes* Müll. Arg. in Linnaea XXXIV. (1865) 24, in DC. Prodr. XV. 2. (1866) 840. — *A. vellamea* Baill. Adansonia V. (1865) 228; Müll. Arg. in DC. Prodr. XV. 2. (1866) 839. — *A. communis* var. *brevipetiolata* Chod. et Hassl. in Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. (1905) 605. — *A. goyazensis* Glaziou in Bull. Soc. Bot. France. Mém. 3g. (1912) 623 (nomen). — *Ricinocarpus brevipes* et *R. vellameus* O. Ktze. Rev. II. (1891) 618. — *A. serratifolia* Klotzsch in Sched. — Suffrutex ad 30—60 cm altus; caules simplices, vel parce ramosi, crassiusculi, dense pilis patentibus tomentosi. Petiolus 4—8 mm longus, rarius longior, tomentosus; limbus 4—7 cm longus, 3—4 cm latus, late ovatus vel obovatus vel lanceolatus, apice rotundatus et brevissime acutatus vel acutus, basi rotundatus, breviter cordatus, breviter serratus, firmus, utrinque tomentosus, supra glabrescens, basi 5—7-nerviis; stipulae filiformes, 4 mm longae. Flores monoici. Spicae ♂ axillares, 1—3 cm longae, sessiles vel breviter pedunculatae, graciles, 2 mm latae, densiflorae, ♀ terminales, fructigerae 3—4½ cm longae, 1 cm latae, densibracteatae; bracteae ♀ capsulis breviores, 3 mm longae, ultra medium 11—15-partitae, tomentosae, pauciglandulosae, uniflorae; dentes lineares, interdum apice trilobi, papilloso-asperii. Sepala ♀ oblonga, acuta, ciliata; ovarium tomentosum; styli circ. 4 mm longi, papilloosi, profunde 5—10-lacinulati. Capsula 3—4 mm lata, griseo-hirta. Semina ovoides, 2 mm longa vel paulo longiora.

Südbrasilianische Provinz: Brasilien (Claussen n. 776, Riedel n. 771!); Minas Geraes, Lagoa Santa (Warming); Goyaz, Paracatu und Rio San Marcos (Pohl n. 807); zwischen Rio Paranyha und Goyaz (Burchell n. 6417; Pohl n. 444), Serrados Veadeiros (Glaziou n. 22113!); Matto Grosso (Gaudichaud n. 246), Cuyaba (Malme n. 1222c!, 2525!). Paraguay, am Apa (Hassler n. 8313!).