

46. *A. shirensis* Hutchinson in Sched. — Perennis; caules e rhizomate orientes, 15—25 cm alti, apice puberuli, mox glabrati, simplices. Folia subsessilia; limbus 2—6 cm longus, 6—9 mm latus, lineari-lanceolatus, acutus, basi obtusus, subcoriaceus, glaber, reticulatus, crenato-serratus, basi 3—5-nervius; stipulae subsetaceae, patentibus, 5 mm longae. Flores monoici. Spicae axillares ♂ vel basi flores ♀ paucos gerentes, 2—6 cm longae, ad medium nudae, puberulae, terminales androgynae, parte ♀ subglobosa, 4 cm diametente, parte ♂ $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ cm longa; bracteae ♀ florigerae coriaceae, uniflorae, densae, ad 7 mm longae, hirsutae, eglandulosae, sere ad basin 9—15-laci-natae, laciniis linearibus, subsetaceo-acuminatis. Sepala ♀ lanceolata; ovarium hirsutum; styli 7 mm longi, breviuscule pinnatim lacinulati. Capsula hirsuta. Semina subglobosa, 2 mm longa, laevia.

Ostafrikanische Steppenprovinz: Nyassaland (Buchanan n. 55!).