

annularis, lobis 6 crenulatis; ovarium sessile, laeve; styli 3, liberi, suberecti, profunde bifidi, stigmatibus haud incrassatis. *Fructus* ignotus.

CONGO BELGE : DISTRICT DES LACS ÉDOUARD ET KIVU : Kamatembe, mont Kabvana, alt. \pm 2200 m., forêt, plante ligneuse à fleurs jaunâtres, avr. 1934, *G. de Witte* 1606* (typus).

Crotonoideae — Acalypheae.

ACALYPHA L.

Acalypha deltoidea Robyns et Lawalrée sp. nov. (§ *Oligogynae-Bipartitae*); ex affinitate *A. bipartitae* Müll. Arg., sed foliis brevius petiolatis, latius deltoideis et apice acutis villosopubescens, spicis breviter pedunculatis, bracteis ♀ crenulatis minoribusque, floris ♀ sepalis apice obtusis et ovario tuberculato satis recedit.

Frutex erectus, ut videtur \pm 1 m. altus, basi ignota; rami elongati, teretes, 3-4 mm. diam., simplices, apice villosotomentelli et demum sat dense puberuli, rubelli et basi lenticellis lineatis longitudinalibus albidis ornati, internodiis 3 cm. attingentibus. *Folia* petiolata; petiolus brevis, 7-11 mm. longus, sat crassus, villosopubescens; lamina ovato-triangularis, basi truncato-subcordata, apice acuta, marginibus serrata, usque ad 5.5 cm. longa et 4.5 cm. lata, praesertim pagina inferiore \pm villosopubescens, herbacea, nervis basilaribus 5 et praeterea nervis lateralibus utrinsecus medianae 4-6; stipulae \pm subulatae, 3.5 mm. longae, \pm villosae. *Spicae* omnes axillares, androgynae, 1.5-7 cm. longae; rachis sat crassus, villosopubescens, 3-7 mm. supra basim bracteam ♀ unicam vel interdum bracteas ♀ duo gerens, supra flores ♀ paululo nudus; pars ♂ terminalis densiflora et sat gracilis, usque ad 5.5 cm. longa et 2 mm. lata; bracteae ♀ fere usque ad basim in partes 2 orbiculares-subreniformes \pm 5 mm. longas et 8 mm. latas basi subcordatas \pm 20-crenulatas bipartitae, utraque pagina pubescentes, foliaceae, 2-florae; bracteae ♂ oblongae, apice obtusae, minutae, \pm 1 mm. longae et 0.5 mm. latae, utraque pagina pubescentes et apice setas longiores paucas gerentes, foliaceae, parte superiore \pm purpureae, 1-6-florae. *Flores* ♀ sessiles; sepala 3, basi connata, late deltoidea, apice obtusa, \pm 0.6 mm. longa et lata,

extus pubescentia, intus pilis sparsis paucis ornata, dimidia parte superiore purpurea; discus nullus; ovarium globosum, superficie trilobatum, verrucosum et pubescens, triloculare, loculis 1-ovulatis, apice stylis 3 liberis parte inferiore pubescentibus et parte superiore 5-7-jugo-lacinulatis laciniis superioribus longioribus ornatum. *Flores* ♂ breviter et graciliter pedicellati; sepala 4, valvata, ovata, apice obtusa, 0.5 mm. longa, extus puberula; discus nullus; stamina 8, in toto 0.4 mm. longa, filamentis liberis, antheris minutis oblongis et loculis liberis divaricatis. *Tricocca* bractea inclusa, depresso-globosa, ± 2 mm. alta et 3 mm. lata, verrucosa et pubescens; semina late ovoidea, ± 1.6 mm. longa et 1.2 mm. lata, glabra, castanea, laevia.

CONGO BELGE : DISTRICT DES LACS ÉDOUARD ET KIVU : Kabasha, alt. 1100-1200 m., savane, buisson érigé, feuilles tomenteuses, inflorescences ♂ vert blanchâtre teinté de violet, oct. 1937, *Lebrun* 8041* (typus).

Observation. — Cette espèce est caractérisée par ses épis androgynes très courtement pédonculés, et par ce caractère elle rappelle les *Oligogynae-Cuspidatae*, mais nous ne lui avons pas trouvé d'affinité dans cette dernière section.

ANACARDIACEAE.

Rhoideae.

RHUS L.

Rhus Bequaertii *Robyns et Lawalrée* sp. nov.; ab affini *R. abyssinica* Hochst. ramulis tantum subtomentellis, foliolis majoribus superficie crenato-serratis et nervis paginae inferioris valde prominentibus, panicula ampliore folia longe superante differt.

Frutex e schedula 2-3 m. altus; rami teretes, cortice rufo-brunnescente lenticellato et lineis longitudinalibus prominulis ornato obtecti, juveniles pilis rufis subtomentelli. *Folia* trifoliolata, petiolo usque ad 3.5 cm. longo longitudinaliter striato interdumque corrugato et ut rami subtomentello suffulta; foliola sessilia, elliptica, apice obtusa, marginibus supra medium grosse serrato-crenatis, crenulis paululo mucronulatis, inaequalia, mediana basi cuneata et usque ad 15 cm. longa et 7 cm. lata, lateralia asyme-